

Allergodil® akut Nasenspray und Allergodil® akut Augentropfen

Allergodil akut Nasenspray. 1 mg / 1 ml, Augentropfen, Lösung.

Zusammens.: **Wirkst.:** Azelastinhydrochlorid, 0,14 mg in 1 Sprühstoß (0,14 ml). Sonst.

Bestandt.: Natriumedetat, Hypromellose, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Citronensäure, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

Anw.: Allergodil akut Nasenspray ist ein Antiallergikum / Antihistaminikum. Zur symptomatischen Behandl. d. saisonalen allerg. Rhinitis (Heuschnupfen) bei Erw., Jugendl. u. Kindern ab 6 Jahren.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt.. Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Nebenw.: **Häufig:** Bitterer Geschmack meist aufgr. unsachgemäßer Anw., der zuweilen Übelk. verursachen kann. **Gelegentlich:** Reizung d. bereits entzündlich veränd.

Nasenschleimhaut (Brennen, Kribbeln), Niesen, Nasenbluten. **Selten:** Übelk.. **Sehr selten:** Überempfindlichk.-reaktionen; Schwindel; Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht; Abgeschlagenheit (Mattigkeit, Erschöpfung) Schwindel- od. Schwächegefühl, die auch durch das Krankheitsgeschehen selbst bedingt sein können. **Weitere Hinweise siehe**

Fachinformation. Apothekenpflichtig. Stand: Februar 2020

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg.

Allergodil® akut Augentropfen. 0,5 mg/ml, Augentropfen, Lösung:

Wirkstoff: Wirkst.: Azelastinhydrochlorid.

Zusammens.: Azelastinhydrochlorid 0,05 % (0,5 mg/ml). Jeder Tropfen enth. 0,015 mg Azelastinhydrochlorid.

Sonst. Bestandt. m. bekannt. Wirkung: Benzalkoniumchlorid (0,125 mg/ml). **Sonst.**

Bestandt.: Natriumedetat, Hypromellose, Sorbitol-Lsg. (kristallisierend), Natriumhydroxid, Wasser f. Injektionszwecke.

Anw.: Behandl. u. Vorbeugung d. Symptome d. saisonalen allergischen Konjunktivitis bei Erw. u. Kindern ab 4 Jahren. Behandl. d. Symptome d. nicht saisonalen (perennialen) allergischen Konjunktivitis bei Erw. u. Kindern ab 12 Jahren.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt..

Nebenw.: **Häufig:** Leichte, vorübergeh. Reizerscheinungen am Auge. **Gelegentlich:**

Bitterer Geschmack. **Sehr selten:** Allerg. Reaktionen (z. B. Hautausschlag u. Pruritus).

Weitere Hinweise siehe Fachinformation! Warnhinweis: Enthält Benzalkoniumchlorid..

Apothekenpflichtig. Stand: September 2018

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg.

Allergodil® akut Duo

Allergodil® akut Duo Augentropfen: Wirkstoff: 1 ml Lösung enth. 0,5 mg Azelastinhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Benzalkoniumchlorid, Natriumedetat, Hypromellose, Sorbitol-Lösung 70 %, Natriumhydroxid-Lsg. 4% u. Wasser für Injektionszwecke.

Allergodil® akut Duo Nasenspray: Wirkstoff: 1 Sprühstoß (0,14 ml) enth. 0,14 mg Azelastinhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Natriumedetat, Hypromellose, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Citronensäure, Natriumchlorid u. gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur sympt. Behndl. von saisonaler allerg. Rhinokonjunktivitis (z.B. Heuschnupfen in Kombination mit allerg. Bindehautentzündung) bei Patienten ab 6 J.

Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gegen Inhaltsstoffe. Kdr. unter 6 J.. *Schwangerschaft und Stillzeit:* Unzureichende Erfahrungen, daher in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft vorsichtshalber nicht anwenden. Im zweiten u. dritten Schwangerschaftsdrittel, nur wenn es unbedingt erforderlich ist u. eine ärztliche Kontrolle erfolgt. In der Stillzeit nicht anwenden, da der Wirkstoff in einem geringen Ausmaß in die Muttermilch ausgeschieden wird.

Nebenwirkungen: *Allergodil® akut Duo Augentr.:* Gelegentl.: Leichte Reizerscheinungen am Auge. Selten: bitterer Geschmack. Sehr selten: Allergische Reaktionen.

Allergodil® akut Duo Nasenspray: Häufig: bitterer Geschmack, meist aufgrund unsachgemäßer Anw. (zurückgeneigtem Kopf), der Übelkeit verursachen kann. Gelegentlich: Reizung der bereits entzündl. veränderten Nasenschleimhaut (Brennen, Kribbeln), Niesen, Nasenbluten. Selten: Übelkeit. Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen, Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht, Abgeschlagenheit, Schwindel- od. Schwächegefühl, die durch das Krankheitsgeschehen selbst bedingt sein können, Somnolenz.

Warn-Hinw.: *Allergodil® akut Duo Augentr.:* Nicht zur Behndl. von Infektionen am Auge geeignet.

Augentropfen enthalten Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kann von weichen Kontaktlinsen aufgenommen werden und kann zur Verfärbung der Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind vor der Anwend. zu entfernen und frühestens 15 Minuten nach der Anwend wieder einzusetzen. Benzalkoniumchlorid kann Reizungen am Auge hervorrufen, insbesondere bei trockenen Augen oder Erkrankungen der Hornhaut

Weitere Informationen: Siehe Fach- u. Gebrauchsinformation. **Apothekenpflichtig.**

Stand: September 2020, MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg.