

Azelastin/Fluticason STADA® Nasenspray 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Wirkstoffe: Azelastinhydrochlorid/Fluticasonpropionat.

Zus.: 1 g Susp. enth. 1.000 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid u. 365 Mikrogramm Fluticasonpropionat. 1 Sprühstoß (0,14 g) enth. 137 Mikrogramm Azelastinhydrochlorid (= 125 Mikrogramm Azelastin) u. 50 Mikrogramm Fluticasonpropionat. **Sonst. Bestandt.:** Glycerol, mikrokrist. Cellulose, Carmellose-Na, Na-edetat, Polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid-Lsg., 2-Phenylethan-1-ol, gerein. Wasser.

Anw.: Lind. d. Sympt. d. mittelschweren bis schweren saison. u. perennialen allerg. Rhinitis, wenn e. Monother. entw. m. e. intranas. Antihistamin. od. e. Glukokortikoid nicht als ausreichend erachtet wird.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf.reakt. einschl. anaphylakt. Reakt., Angioöd. (Gesichts- od. Zungenöd. u. Hautausschlag), Bronchospasmus; Kopfschm., Dysgeusie (unangen. Geschmack), unangen. Geruch, Schwindel, Somnol. (Benommenh., Schläfrigkeit), Glaukom, Erhö. d. Augeninnendruckes, Katarakt, verschwomm. Sehen, Nasenbluten, Beschwerden a. d. Nase (einschl. Nasenreiz., Brennen, Jucken), Niesen, trock. Nasenschleimhaut, Husten, Halstrockenh., Rachenreiz., Perforat. d. Nasenscheidewand, Schleimhauteros., Nasengeschwüre, Mundtrockenh., Übelk., Hautausschlag, Prur., Urtik., Abgeschlagenh. (Mattigk., Erschöpf.), Schwächegefühl; system. NW mögl.; Wachstumsverzög. b. Kdr. u. Jugendl., Osteoporose.

Warnhinw.: Enth. Benzalkoniumchlorid.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Oktober 2023